

Grandes cultures

Le 7 Avril 1988

n° 7

B L E : Intervenir contre le Piétin-verse
au stade 6.

ORGE : Surveiller la Rhynchosporiose.

COLZA : Intervenir contre le Sclerotinia
aux stades F1 - G1.

BLE

(Redressement - 5 (épi à 1 cm)
Stades) 1 noeud - 6

MALADIES

⊗ Situation

• EN AUVERGNE

. PIETIN-VERSE : présent dans 60 % des parcelles de l'ALLIER à un niveau modéré.

Le seuil est dépassé dans 25 % de ces parcelles.

Très faible attaque dans les autres départements.

. SEPTORIOSE : observée sur de nombreuses parcelles de l'ALLIER sur F4.

Stagnation actuellement.

. ROUILLE BRUNE : pustules sur les feuilles basses dans quelques parcelles (variétés sensibles).

• EN LIMOUSIN

. SEPTORIOSE : progression modérée mais présente sur toutes les parcelles sur les feuilles de la base.

⊗ Préconisations

• EN AUVERGNE

Pour le Piétin-verse : Situations de résistance avec BMC : intervenir avec prochloraz ou fluzilazole dès maintenant si le seuil de 20 % de talles touchés est atteint et de toute manière au stade 6 même si ce seuil n'est pas atteint. Passé le stade 2 noeuds (7) l'efficacité décroît très rapidement.

Pour les maladies du feuillage, attendre le stade 2 noeuds (7) pour juger d'une intervention.

• EN LIMOUSIN

Attendre le stade 2 noeuds (7) pour intervenir contre la Septoriose.

P.1/40

ORGE D'HIVER

Stades (Redressement - 5
)
(1 noeud - 6

MALADIES

⊗ Situation

- . RHYNCHOSPORIOSE : sur toutes les parcelles du LIMOUSIN avec progression. Elle est peu virulente en situation de plaine en AUVERGNE. La maladie est plus active en zones d'altitude. (HAUTE-LOIRE, COMBRAILLES).
- . ROUILLE NAIN : déjà bien installée dans le sud du PUY-DE-DOME et en HAUTE-LOIRE (BRIOUDE).
- . OIDIUM : attaque faible à modérée.

⊗ Préconisations

*Prévoir une intervention contre la Rhynchosporiose dès maintenant si la maladie est présente sur la F3.
En cas de présence de Rouille naine, choisir un fongicide efficace sur les 2 maladies.
Intervenir aussi si la Rouille naine est seule (pustules du F3).*

COLZA

Stades (Boutons séparés - E
)
(Début floraison - F1 (BIENVENU)

MELIGETHES

MALADIES

⊗ Situation

- . CYLINDROSPORIOSE : recrudescence sur JET 9 dans l'ALLIER (Sologne).

⊗ Préconisations

Intervenir rapidement sur JET 9 si la Cylandrosporiose progresse sur les feuilles supérieures.

Pour le Sclerotinia dans les secteurs à risques, il faut intervenir entre le stade début floraison (F1) et la chute des premiers pétales (G1).

Ce stade sera atteint rapidement sur BIENVENU.

► APV NOUVELLES

IMPACT R 1 l/ha et IMPACT RM à 1,25 l/ha sur Cylindrosporiose, Pseudocercospora et Sclerotinia.

PROTECTION DES VEGETAUX ET TELEMATIQUE

Vous voulez connaître la situation phytosanitaire dans votre secteur - instantanément 24 h/24 - savoir s'il faut intervenir ? C'est désormais possible : par une consultation rapide (messages brefs - actualisés) - sans contrainte d'abonnement (TELETEL 3) à faible coût (prix communication) en utilisant votre MINITEL.

*Tél. 36.15

*Code : AVERT

*Taper 1